

Exemplaire réservé à l'affichage

4^e année

N° 91 bis

14 mai 1952

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

22, rue de Brest — LYON

Téléphone : Franklin 82-51

Bimensuel

Compte chèques postaux Lyon 2168-43 — Fédération des Groupements de Défense, 7, place Ampère - LYON

AVERTISSEMENT

VIGNE

MILDIU - OIDIUM.

Dans la région du Beaujolais, des taches de **Mildiou** ont été observées à partir du 4 mai. Le repiquage ayant été presque immédiat par suite des fortes pluies du 6 qui se sont produites à une température de 14 à 18°, les premiers foyers secondaires doivent apparaître dans cette région vers le 15 mai.

En conséquence, un traitement au **cuivre** (bouillie bordelaise, bouillie bourguignonne, Verdet, oxychlorure ou oxyde cuivreux) sera effectué dans les régions n° 35 - 37 - 38 et 43 entre le 14 et le 16 mai.

Si, pour diverses raisons, le traitement n'a pu être effectué dans ces délais, il ne pourra être effectué dans les jours suivants que si l'on n'observe pas après le 15 de pluies prolongées à température supérieure à 11°.

Sur les cépages sensibles à l'**Oïdium**, ajouter un **soufre mouillable** à la bouillie.

LES MALADIES DE LA VIGNE

Hormis les feuilles portant réellement des taches de Mildiou, le concours de détection a fait affluer à la Station de nombreux échantillons de maladies diverses. Afin d'éviter à nos abonnés des envois inutiles, nous rappelons les symptômes des diverses maladies actuellement observées sur la vigne :

1° MILDIOU : tache diffuse, translucide, jaunâtre, de 1 à 2 cm. de diamètre ; un duvet blanc assez dense et régulier apparaît au bout de quelques jours à la face inférieure ; une à trois ou quatre taches par feuille.

2° PIQURES D'HÉMIPTÈRES : petites taches de 1 à 3 mm. de diamètre, décolorées, translucides, avec un point noir au milieu, taches très nombreuses qui n'évoluent pas.

3° ERINOSE (présence dans les tisons de minuscules araignées) : taches assez anguleuses, de nombre et d'étendue très variables, couvertes d'un duvet très dense, blanc — sale — d'abord (ou rose violacé sur les cépages noirs) à la face inférieure et même à la face supérieure dans les fortes invasions, déformation du limbe en cloque au niveau des taches seulement et coloration violacée des tissus sur les cépages noirs.

4° OIDIUM : duvet blanc, inégal, léger, assez étendu, à la face inférieure de la feuille ; taches polygonales, décolorées, au milieu de zones d'un vert sombre ; déformation en cloques sur une vaste étendue de tissus débordant la zone portant le duvet.

5° ROUGEOT PATHOLOGIQUE : coloration d'une assez large zone du limbe en rouge violacé sombre, à partir du bord en général, suivie de brunissement et de dessèchement du limbe sans déformation antérieure.

6° CHLOROSE : virage assez rapide du vert au jaune de l'ensemble du feuillage d'un pied.

*Le Contrôleur
chargé des Avertissements agricoles :*
P. LATARD.

*Le Contrôleur
chargé des fonctions d'Inspecteur
par intérim :*
L. IMBERT.